



DLP 29 - 5 - 87030904

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA Cedex
Tél. 61.24.06.51

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel 115 F.
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne
CCP 8612-11 R Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 5 DU 5 MAI 1986

BLE TENDRE

Stade végétatif 7 (deuxième noeud formé) à 8 (dernière feuille visible encore enroulée) pour la majorité des variétés en toutes zones, excepté sur les cultures d'altitude (+ de 500 m), en Aveyron en particulier (encore au stade 6).

9 (épi gonflé, ligule dernière feuille visible) sur variétés les plus précoces (CASTAN, PRINQUAL, FLORENCE AURORE notamment).

Situation**MALADIES DU PIED**

Piétin verse et **Rhizoctone** présents dans près de 50 % des situations avec des attaques faibles (moins de 20 % des tiges attaquées).

Fusariose très fréquente.

MALADIES DU FEUILLAGE

Septoriose présente sur le feuillage de la base au niveau de la F4 (feuille n° 4 en comptant à partir du haut de la tige) dans 60 % des parcelles du Réseau de Surveillance, particulièrement sur variétés CASTAN, GALA, TALENT, TANGO, FESTIVAL.

Très rares pustules de **Rouille brune** observées sur variétés GALA et CASTAN.

Présence d'**Oïdium** dans quelques parcelles.

Préconisations

Intervenir, avec un produit efficace sur **Septoriose**, **durant la période du 9 au 15 mai** sur les variétés suivantes :

- variétés dites de force : **CASTAN, FLORENCE AURORE** et **PRINQUAL**
- autres variétés comme **GALA, FESTIN, FESTIVAL, TALENT** ou **TANGO**, dans les parcelles arrivées au moins au stade 9, dont l'objectif de rendement est supérieur à 65 quintaux.

Pour toutes les autres parcelles, attendre pour intervenir.

Utiliser l'un des produits cités dans le dépliant ci-joint, établi conjointement par l'I.T.C.F., l'I.N.R.A. et le S.P.V., en choisissant une spécialité efficace sur **Septoriose** et éventuellement maladies du pied en cas de présence dans la parcelle.

Conserver soigneusement ce dépliant auquel il sera fait référence dans nos prochains bulletins.

P.1.34

BLE DUR

Stade végétatif 6 (premier noeud) à 7 (deuxième noeud formé), 8 dans les situations précoces.

Situation

MALADIES DU PIED

Situation identique à celle des blés tendres.

MALADIES DU FEUILLAGE

Septoriose sur F4 dans 20 % des parcelles.

Rouille brune toujours très rare.

Préconisation

Attendre un prochain bulletin pour intervenir.

ORGE

Stade végétatif 7 (deuxième noeud formé) à 9 (épi gonflé, ligule dernière feuille visible).

Situation

Présence faible de **Maladies du pied**.

Rhynchosporiose et **Oïdium** régulièrement observés sur le feuillage de la base.

Préconisation

Dans les parcelles déjà traitées, il est inutile d'intervenir à nouveau.

Dans les parcelles non traitées, il est conseillé d'intervenir dès réception du présent bulletin.

Choisir un des produits efficace contre la Rhynchosporiose indiqués dans le dépliant ci-joint.

Attention

Contrairement à ce qui est indiqué dans le dépliant, les spécialités BAYLETON TOTAL et BAYLETON TRIPLE présentent une bonne efficacité sur Oïdium et devraient apparaître en vert foncé (au lieu de rouge).

COLZA

Stade végétatif F2 (nombreuses fleurs ouvertes).

Situation

Piégeage toujours important de Meligèthes et Charançons des siliques.

Préconisation

Toute intervention contre les Meligèthes est devenue inutile.

Intervenir contre les Charançons des siliques lorsque le seuil d'intervention (1 charançon par plante après observation de 50 plantes) est atteint, dans les cultures n'ayant pas encore fait l'objet de ce traitement.

MAIS

DESINFECTION DU SOL

Une intervention contre les Taupins et les Scutigerelles est recommandée au semis.

Se reporter au dépliant A.G.P.M. - S.P.V. ci-joint pour le choix des produits.

*

*

*

*